Larvakill Premix

Premezcla larvicida para alimento

RSCO-PEC-INAC-0173-310-001-001

DESCRIPCIÓN:
Es un regulador sintético del crecimiento de insectos con actividad contra moscas y pulgas. Su actividad de manifiesta por contacto, interfiriendo en el proceso de muda en los estadios larvales que previene la pupación normal, provocando pupas deformadas que impide la eclosión de moscas y pulgas adultas.

Evita el desarrollo larvario y la pupación de la mosca del establo *Stomoxys calcitrans*, mosca del cuerno *Haematobia irritans*, pequeña mosca doméstica *Fannia canicularis*, mosca del estiércol de los pollos *Fannia pusio*, mosca domestica *Musca domestica*, mosca de la fruta *Drosophila melanogaster* y otras larvas de dípteros que se reproducen en el estiércol ó en desechos en fermentación; así como en las larvas de las pulgas como *Echidnophaga gallinacea* y *Pulex irritans* que se desarrollan en la cama de las gallinas ponedoras comerciales y reproductoras.

COMPOSICIÓN:

Ingrediente activo	**% en peso**
N-ciclopropil-1,3,5-triazina-2,4,6-triamina	
Conteniendo no menos de:	1
(equivalente a 10 g de i.a./kg)	
Ingredientes inertes:	
Vehículos y estabilizadores	
Conteniendo no más de:	99
TOTAL	100

ESPECTRO DE ACCIÓN:
Larvas de moscas
Mosca del establo *Stomoxys calcitrans*
Mosca del cuerno *Haematobia irritans*
Pequeña mosca domestica *Fannia canicularis*
Mosca del estiércol de los pollos *Fannia pusio*
Mosca doméstica *Musca domestica*
Mosca de la fruta *Drosophila melanogaster*

Larvas de pulgas Pulga de la gallina *Echidnophaga gallinacea*
Pulga del hombre *Pulex irritans*

MODO DE EMPLEO:
Larvakill Premix se adiciona al alimento balanceado de las ponedoras durante su elaboración. Las gallinas lo ingieren en cada ración diaria, siendo eliminado con las heces, donde actúa sobre las larvas de las moscas y de las pulgas que se desarrollan en la gallinaza y en la cama de las aves respectivamente.

DOSIS:
Mezclar 500 gramos de Larvakill Premix por tonelada de alimento balanceado, al iniciar la temporada de moscas durante 4 a 6 semanas seguidas y suspender por el mismo lapso (4 a 6 semanas) y así sucesivamente.
La acción larvicida de Larvakill Premix comienza a observarse de los tres a los cinco días después de la aplicación.

VENTAJAS:
Mecanismo de acción diferente por ser un regulador del crecimiento de los insectos que actúa inhibiendo la muda y la pupación.

Usado dentro de un programa integral de adulticidas y larvicidas evita la reinfestación de moscas y pulgas.

LAPISA, S.A. DE C.V.
Carr. La Piedad-Guadalajara Km. 5.5
Col. Camelinas C.P. 59375
La Piedad, Michoacán.
Tel. 01 (352) 52 613 00
www.lapisa.com

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE
ISO 9001 FM 40665 ANAB BSI
Lapisa® SALUD ANIMAL

PRECAUCIONES:
Tiempo de retiro: No consumir la carne de aves tratadas hasta tres días después de terminar la adición del mismo.
Evite contaminar las fuentes de agua con los residuos del lavado ó limpieza.
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales.
Almacénese en un lugar fresco y seco.
Evitar al máximo la entrada de agua sobre la gallinaza y la cama para no diluir al Larvakill Premix por debajo de la concentración mínima de efectividad larvicida.

PRESENTACIÓN:
Cubeta de 10 kilos

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

LAPISA, S.A. DE C.V.
Carr. La Piedad-Guadalajara Km. 5.5
Col. Camelinas C.P. 59375
La Piedad, Michoacán.
Tel. 01 (352) 52 613 00
www.lapisa.com

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE
ISO 9001 FM 40665 ANAB BSI
Lapisa® SALUD ANIMAL